

## 16 اگست تا 31 اگست تک کپاس کی بہتر نگہداشت کیلئے سفارشات

نقصان دہ کیڑوں کا تدارک: سفید مکھی کے انڈے، بچے اور بالغ کو مد نظر رکھتے ہوئے زرعی ادویات کا انتخاب کر کے فوراً پھرے کریں۔ پھرے کے لیے 120 تا 150 لیٹر پانی استعمال کریں۔ مزید برآں موجودہ موسمی حالات میں گلابی سنڈی کے حملے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لہذا احتیاطی تدارک کے لیے پھرے کریں۔ علاوہ ازیں تھرپس اور گدھڑی کے تدارک کے لیے پیسٹ سکاؤٹنگ کر کے بروقت پھرے کریں۔ گدھڑی سے متاثرہ پودوں کی نشاندہی کر کے دوبارہ پھرے کریں۔

❖ نقصان دہ کیڑوں کے مؤثر تدارک کے لیے 7 دن کے وقفے سے دوبارہ پھرے کریں۔

❖ پھرے صبح یا شام 5 بجے کے بعد کریں۔

❖ ایک ہی گروپ کی زہروں کو بار بار استعمال نہ کریں بلکہ مختلف گروپ کی زہروں کو تبدیل کر

کے پھرے کریں تاکہ کیڑوں میں زہروں کے خلاف قوت مدافعت پیدا نہ ہو۔

نائٹروجن کھاد کا استعمال: جن کھیتوں میں کپاس کا پودا مطلوبہ قد (4 فٹ) حاصل کر چکا ہے وہاں نائٹروجنی کھادوں کا استعمال بند کر دیں۔ جہاں پودے کا قد چھوٹا یعنی 2 فٹ ہے وہاں ایک بوری گوارا کھاد یا امونیم سلفیٹ یا یوریا فی ایکڑ استعمال کریں۔ کھادوں کا استعمال اگست کے آخر تک مکمل کر لیں۔



پتھر وڈوائرس کے حملے سے بچاؤ کیلئے اقدامات: اس بیماری کے حملے کی صورت میں آدھی بوری یوریا ہفتہ کے وقفے سے استعمال کریں۔ علاوہ ازیں زنک سلفیٹ بحساب 250 گرام، بورک ایسڈ بحساب 300 گرام اور میگنیشیم سلفیٹ 500 گرام 100 لیٹر پانی میں حل کر کے فی ایکڑ پھرے کریں۔

آپاشی: فصل کو پانی لگاتے وقت قسم کپاس، زمین اور محکمہ موسمیات کی بارش کی پیشین گوئی کو ضرور مد نظر رکھیں۔ پھل پھول آنے پر پانی کی کمی نہ آنے دیں۔

چنائی: چنائی صاف ستھری کریں تاکہ مارکیٹ میں اچھے دام مل سکیں اور ملکی سطح پر اچھے معیار کی روٹی پیدا کر کے مقامی و بین الاقوامی مارکیٹ میں بہتر معاوضہ حاصل کیا جاسکے۔

بارش کے پانی کا نکاس: زیادہ بارش کی صورت میں پانی کے نکاس کا فوری بندوبست کیا جائے۔

پہرے و مقدار (فی ایکڑ)	کپاس کے موجودہ اہم ضرر سائل کیڑے
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ہائیڈروکسی پیریت 240SC (گروپ-23) + پانچ پر بحساب 125+250 فی لیٹر</li> <li>2. فلوپنٹا 50 WG (گروپ-29) بحساب 80+120 گرام</li> <li>3. ڈائی میتھیل سٹریٹن 500SC (گروپ-12) بحساب 200 فی لیٹر</li> <li>4. مینا پیپر 150E (گروپ-125) بحساب 150 گرام فی ایکڑ</li> <li>5. پازی پرو کی ٹن 10.8 EC (گروپ-7) بحساب 500 فی لیٹر</li> </ol>	 <p>سفید مسمی (5 بانٹ یا پتے فی پتہ)</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ہائیڈروکسی پیریت 10EC (گروپ-3) بحساب 250 فی لیٹر</li> <li>2. مینا پیپر 150E (گروپ-3) بحساب 100 فی لیٹر</li> <li>3. ڈائی میتھیل سٹریٹن (گروپ-3) + زوالی اینڈو ساقس 36EC (گروپ-1) بحساب 500+600 فی لیٹر</li> <li>4. سپینٹورام 120SC (گروپ-5) بحساب 80 فی لیٹر</li> </ol>	 <p>نہانی سنڈی (5 لٹھہ تنصان)</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. فلوپنٹا 50 WG (گروپ-29) بحساب 60+80 گرام</li> <li>2. ڈائی ٹوٹ لے ران 20 SG (گروپ-4) بحساب 100 گرام</li> <li>3. ٹائٹن پاز ام 10 AS (گروپ-4) بحساب 200 فی لیٹر</li> <li>4. سلفو کرسٹور 50 WG (گروپ-4) بحساب 30 گرام</li> </ol>	 <p>بہر تیل (1 فی پتہ)</p>

پہرے و مقدار (فی ایکڑ)	کپاس کے موجودہ اہم ضرر سائل کیڑے
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. کھور فیتا پاز 360SC (گروپ-13) بحساب 75 فی لیٹر</li> <li>2. ڈی سیلٹ 97 DF (گروپ-1) بحساب 250+300 گرام</li> <li>3. سپینٹورام 120SC (گروپ-5) بحساب 60 فی لیٹر</li> </ol>	 <p>تھریس (8 سے 10 بانٹ فی پتہ)</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. پرو فینو قاس 50EC (گروپ-1) بحساب 800 فی لیٹر</li> <li>2. سائپر میتھیل سٹریٹن (گروپ-3) + پرو فینو قاس 40EC (گروپ-1) بحساب 500 فی لیٹر۔</li> <li>3. میلا تھیان (گروپ-1) بحساب 500 فی لیٹر</li> </ol>	 <p>ٹی بک (کھیت میں حملہ نظر آئے)</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. فلوپنٹا 50 WG (گروپ-28) بحساب 50 فی لیٹر</li> <li>2. لیو فینوران EC X 5 (گروپ-15) بحساب 200 فی لیٹر</li> <li>3. ایما میکسٹن بنزواٹ 1.9EC (گروپ-6) بحساب 200 فی لیٹر</li> </ol>	<p>لشکری سنڈی (کھیت میں حملہ نظر آئے)</p>

پہرے و مقدار (فی ایکڑ)	کپاس کی موجودہ اہم ضرر سائل بیماریاں
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. جزی بوٹیوں کا موثر تدارک</li> <li>2. سفید مسمی کا موثر کنٹرول</li> <li>3. زیادہ وائرس کے حملے کی صورت میں 7 دن کے وقفے سے آدھی بوری پور یا پکا استعمال</li> <li>4. اجزائے خوراک کا سپر سے</li> </ol> <p>پونٹا شیم ہائیڈریٹ 200 گرام، میگنیشیم سلفیٹ 300 گرام، زنک سلفیٹ 200 گرام اور بوریکس 200 گرام فی ایکڑ 100 لیٹر پانی میں حل کر کے سپرے کریں۔</p>	 <p>پتہ مروڑ وائرس</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ڈائی میتھیل سٹریٹن 500SC (گروپ-3) بحساب 250 فی لیٹر فی ایکڑ</li> <li>2. زوالی ٹوٹ لے ران (گروپ-11) + ڈی ایم آئی بیو کوٹازول (گروپ-3) 100 گرام فی 100 لیٹر پانی</li> <li>3. ڈائی میتھیل سٹریٹن (گروپ-3) 300-400 گرام فی 100 لیٹر پانی</li> <li>4. فینو کوٹازول 5 لٹھہ ڈائی میتھیل سٹریٹن (گروپ-3) بحساب 400 فی لیٹر فی ایکڑ</li> <li>5. بیو کوٹازول 12.5 لٹھہ ڈائی میتھیل سٹریٹن (گروپ-3) بحساب 250 فی لیٹر فی ایکڑ</li> <li>6. اینڈو کی ٹون (گروپ-11) + بیو کوٹازول 32.5 لٹھہ ڈائی میتھیل سٹریٹن (گروپ-3) بحساب 120 فی لیٹر فی ایکڑ</li> </ol>	<p>کپاس کے پتوں کا جراثیمی جھلساؤ</p>